

Vorbereitung 14.9.2026

## 4. Quadratische Gleichungen und Ungleichungen


### 4.1 Quadratische Gleichungen

#### 4.1.1 Arten quadratischer Gleichungen

1)  $x^2 = 9$

$$x_1 = 3$$

$$x_2 = -3$$



$$\begin{aligned} \mathbb{L} &= \{x \in \mathbb{R} \mid x = 3 \vee x = -3\} \\ &= \{-3, 3\} \end{aligned}$$

2)  $(x+6)^2 = 0 \quad | \sqrt{\phantom{x}}$

$$x_{1,2} + 6 = \pm 0$$

$$x_{1,2} = -6$$



3)  $x^2 - 10x + 25 = 0$

$$(x-5)^2 = 0 \quad | \sqrt{\phantom{x}}$$

$$x_{1,2} = 5$$

$$4) \quad x^2 - 49 = 0$$

$$(x+7)(x-7) = 0$$

oder

$$x^2 - 49 = 0$$

$$x^2 = 49 \quad | \sqrt{\phantom{x}}$$

$$x_1 = 7$$

$$x_2 = -7$$

Ein Produkt ist Null, wenn ein Faktor Null ist.

$$x_1 + 7 = 0 \quad x_2 - 7 = 0$$

$$x_1 = -7 \quad x_2 = 7$$

$$\left( x + \frac{7}{3012} \right) \left( x - \frac{13^2}{\sqrt{\pi}} \right) = 0$$

$$x_1 = -\frac{7}{3012}$$

$$x_2 = \frac{13^2}{\sqrt{\pi}}$$

$$x^2 - 2x - 15 = 0$$

$$(x+3)(x-5) = 0$$

$$x_1 = -3$$

$$x_2 = 5$$

Aber:

$$x^2 - 137x - 591 = 0$$

$$x^2 - \frac{19}{7}x + \frac{91}{1112} = 0$$

Lösen quadratischer Gleichungen mittels quadratischer Ergänzung

$$x^2 - 5x - 14 = 0$$

$$x^2 - 5x + \left(\frac{5}{2}\right)^2 - \left(\frac{5}{2}\right)^2 - 14 = 0$$

$$a^2 - 2ab + b^2$$

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} - \frac{56}{4} = 0$$

$$\left(x - \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{81}{4} \quad | \sqrt{\phantom{x}}$$

$$x_{1/2} - \frac{5}{2} = \pm \frac{9}{2}$$

$$x_1 = \frac{5}{2} + \frac{9}{2} = 7$$

$$x_2 = \frac{5}{2} - \frac{9}{2} = -2$$

Quadratische Ergänzung allgemein durchführen, um Formel zu entwickeln

$$\| \quad x^2 + px + q = 0 \quad \|$$

$$\underbrace{x^2 + px + \left(\frac{p}{2}\right)^2 - \left(\frac{p}{2}\right)^2 + q = 0}$$

$$\left(x + \frac{p}{2}\right)^2 = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q \quad |\sqrt{\phantom{x}}$$

$$x_{1,2} + \frac{p}{2} = \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

$$\| \quad x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \quad \|$$

Die Lösungen hängen von  $p$  und  $q$  ab und somit vom Radikanden, der sog. Diskriminante.

1)  $\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q > 0$       2 verschiedene Lösungen      2 Werte  $x_1, x_2$

2)  $\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q = 0$       2 gleiche Lösungen      1 Wert  $x_1 = x_2$

3)  $\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q < 0$       keine reelle Lösung

Beispiele:

$$x^2 - 4x + 80 = 0$$

$$p = -4 \quad q = 80$$

$$x_{1,2} = -\frac{-4}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{4}{2}\right)^2 - 80}$$

$$x_{1,2} = 2 \pm \sqrt{4 - 80}$$

keine reelle Lösung

Spezielle Fälle:

$$x^4 - x^2 - 6 = 0$$

Substitution:  $z := x^2 \Rightarrow z^2 = x^4$

$$\Rightarrow z^2 - z - 6 = 0$$

$$z_{1,2} = -\frac{-1}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-1}{2}\right)^2 + 6}$$

$$= \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{24}{4}}$$

$$= \frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{25}{4}}$$

$$z_1 = 3$$

$$z_2 = -2$$

Rücksubstitution:

$$z_1 = x^2$$

$$3 = x^2$$

$$x_1 = +\sqrt{3}$$

$$x_2 = -\sqrt{3}$$

$$z_2 = x^2$$

$$-2 = x^2$$

keine weiteren reellen Lösungen

$$x^6 - 5x^3 + 6 = 0$$

Substitution:  $z := x^3 \Rightarrow z^2 = x^6$

$$\Rightarrow z^2 - 5z + 6 = 0$$

$$(z - 2)(z - 3) = 0$$

$$z_1 = 2$$

$$\Rightarrow$$

$$x_{1,2,3} = \sqrt[3]{2}$$

$$z_2 = 3$$

$$\Rightarrow$$

$$x_{4,5,6} = \sqrt[3]{3}$$

$$x^{10} + 3x^4 + 8 = 0$$

Nicht mit Substitution lösbar, da  $(x^4)^2 = x^8 \neq x^{10}$

## Allgemeine quadratische Gleichung

$$7x^2 + 19x - 31 = 0$$

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad | :a \quad \text{mit } a \neq 0$$

$$x^2 + \boxed{\frac{b}{a}}_p x + \boxed{\frac{c}{a}}_q = 0$$

Division durch  $a$  ist erlaubt, da für  $a=0$  keine quadratische Gleichung vorliegt

$$x_{1,2} = -\frac{b}{2a} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}}$$

### Beispiel:

Wird eine Seite eines Quadrats auf ein Drittel ihrer Länge verkürzt und die andere Seite um 8 cm verlängert, so nimmt der Flächeninhalt um 8 cm<sup>2</sup> ab. Wie lang ist die Quadratseite?

$$\frac{1}{3}a(a+8) = a^2 - 8$$

$$\frac{1}{3}a^2 + \frac{8}{3}a = a^2 - 8$$

$$-\frac{2}{3}a^2 + \frac{8}{3}a + 8 = 0$$


⋮

$$a_1 = 6$$

$$a_2 = -2 \quad \text{nicht sinnvoll, da Längen nicht negativ sind}$$


Probe:

$$\begin{array}{rcl} 2 \cdot 14 & = & 36 - 8 \\ 28 & = & 28 \quad \checkmark \end{array}$$




### 4.1.3 Grafische Darstellung


$$x^2 = 9$$
$$f(x) = x^2$$




Scheitelpunkt  $S(0|0)$



$$f(x) = x^2 + 1$$




$$f(x) = (x-2)^2$$




$$f(x) = (x+2)^2 - 1$$

S(-2 | -1)




$$f(x) = -x^2$$




$$f(x) = 2x^2$$

Schmal  
gestreckt



$$f(x) = \frac{1}{2}x^2$$

breiter  
gestaucht



$$f(x) = (x+2)^2 - 1 \text{ Scheitelpunktform}$$

$$f(x) = ax^2 + bx + c \text{ allgemeine Darstellung}$$

ausmultiplizieren  
quadratische Ergänzung

## 4.2 Quadratische Ungleichungen

$$x^2 > 9$$

$$\Rightarrow x > 3 \quad \vee \quad x < -3$$

oder



$$x^2 < 9$$

$$\Rightarrow x < 3 \quad \wedge \quad x > -3$$

und

$$-3 < x < 3$$



Zwei Lösungsstrukturen:


- zwei getrennte Bereiche
- ein zusammenhängender Bereich

Vorsicht beim Quadrieren von Ungleichungen!

Siehe Zusatzdokument

$$f(x) = x^2$$

$$x^2 > 9$$



Aufgaben

Skript

Nr. 33 a, d, g

p-q-Formel

Nr. 34 d, e, f, l

quadratische Ergänzung

Zusatzdokument

Kap. 4.1

Nr. 1-9

Kap. 4.2

Teil 1: Nr. 1, 4, 5

Teil 2: Nr. 2, 3